

PCT/CU03/00020



REPÚBLICA DE CUBA

PCT/CU03/00020

REC'D 21 JAN 2004

WIPO PCT



Ing. María de los Angeles Sánchez Torres, Directora de la OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

CERTIFICO: Que bajo el número trescientos treinta y seis del año dos mil dos del Registro de Entrada, fue presentada en esta **OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL** la solicitud de Certificado de Patente de Invención, por **FORMULACIONES PARA ADMINISTRAR POR VÍA RECTAL AGENTES CON ACCIÓN TROMBOLÍTICA**, con fecha veintisiete de diciembre de dos mil dos, a las nueve horas y cincuenta minutos ante meridiano, por Mariela Vázquez Castillo, Agente Oficial, ciudadana cubana, a nombre y en representación del CENTRO DE INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA, cuya invención fue creada por Luciano Francisco Hernández Marrero; Beatriz Tamargo Santos; María Acellá Marrero Miragaya; Ana Aguilera Barreto; Lisette González Chávez; Eduardo Martínez Díaz; Beatriz Torrez Cabrera; Carelia Cosme Díaz y Milesa Yeni Sarmiento Mayea.

ASIMISMO CERTIFICO: Que la mencionada solicitud de Certificado de Patente de Invención, se encuentra actualmente en tramitación.

TAMBIÉN CERTIFICO: Que el Resumen, la Memoria Descriptiva, las Reivindicaciones y los Dibujos que se acompañan, son exactamente iguales a las que obran en el expediente.

Y a petición de Mariela Vázquez Castillo, Agente Oficial, se expide la presente en la Ciudad de La Habana, República de Cuba, a los veintiséis días del mes de diciembre de dos mil tres.


Ing. María de los Angeles Sánchez Torres
Directora
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

RESUMEN

FORMULACIONES QUE CONTIENEN AGENTES DE ACCIÓN TROMBOLÍTICA PARA SU ADMINISTRACION POR VÍA RECTAL.

- 5 Formulaciones farmacéuticas en forma de supositorio que contienen agentes con acción trombolítica capaces de penetrar en la mucosa rectal, para el tratamiento de la enfermedad hemorroidal aguda y/o de origen trombótico.

10


Lic. Argia Poveda Marcheco
Representante Legal 075
CIGB



MEMORIA DESCRIPTIVA

FORMULACIONES QUE CONTIENEN AGENTES DE ACCIÓN TROMBOLÍTICA PARA SU ADMINISTRACION POR VÍA RECTAL

La presente invención está relacionada con el campo de la biotecnología, con las ciencias médicas y la industria farmacéutica, y en particular con la obtención de formulaciones para ser administradas por vía mucosal, que contienen un agente trombolítico de origen peptídico o proteico como principio activo y excipientes farmacéuticos como inhibidores de proteasas, promotores de la absorción, estabilizantes, entre otros.

Entre los agentes antitrombolíticos utilizados en esta invención se encuentran la estreptoquinasa (SK), y activador tisular del plasminógeno (t-PA), no descartándose la factibilidad de poder utilizar cualquier otra molécula con características antitrombolíticas similares.

Las hemorroides son una de las patologías de la vía rectal de más alta incidencia en la población a nivel mundial, alrededor de un 4% de prevalencia en Estados Unidos e Inglaterra (Johanson JF, Sonnenberg A. The prevalence of hemorrhoids and chronic constipation, and epidemiological study. Gastroenterology 1990; 98:380). Las hemorroides son dilataciones de las venas de los plexos venosos de la mucosa del recto o del ano. Si las afectadas son las del plexo superior se llaman hemorroides internas, se sitúan por arriba del conducto anal y se encuentran cubiertas por mucosa. Las del plexo venoso inferior se hallan situadas por debajo de la unión ano rectal y están cubiertas por piel exterior. El sistema de drenaje de ésta zona carece de válvulas, y por ello la posición erecta del hombre aumenta la presión en el interior de las venas hemorroidales y por lo tanto predispone a la enfermedad hemorroidal. Como complicación de las hemorroides se puede producir una estrangulación de las mismas con aparición de un color oscuro, debido a la trombosis subyacente.

Para el tratamiento de esta patología existen múltiples formulaciones de aplicación local en forma de supositorios o ungüentos rectales, que contienen anestésicos, antiinflamatorios y antiprurífticos como el ERCAL, SHERIPROCT, ULTRAPROCT, XYLOPROCT, PROCTAXID, PROCTOGLYVENOL

(Rosenstein E. Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Cuadragésima primera edición 1995, 778,1539,1730,1798,1437,1436). Las formulaciones antes mencionadas centran su principal acción en la disminución de la inflamación y el dolor.

- 5 Actualmente se han evaluado mediante ensayos clínicos el uso de baso dilatadores (Nifedipina tópica y anticoagulantes como la crema de heparina que han demostrado alguna efectividad con eventos adversos en el tratamiento de esta entidad (Perrotti P, Antropoli C, Molino D, De Stefano G, Antropoli M. Conservative treatment of acute thrombosed external hemorrhoids with topical
10 nifedipine, Dis Colon Rectum 2001 44(3):405-409).

Además, existen otros tratamientos que son utilizados en las hemorroides de grado I y II como las inyecciones esclerosantes, fotocoagulación, hemorroidolisis, la criocirugía y LASER. Pero estos también presentan desventajas debido a que necesitan personal especializado, equipamiento y la
15 asistencia obligatoria a centros de atención médica.

En ocasiones existen complicaciones en las hemorroides de grado III y IV debido a que estas se trombosan (enfermedad hemorroidal aguda) y los medicamentos y tratamientos antes mencionados no resuelven esta patología, por lo que hay que eliminar el trombo mediante tratamiento quirúrgico
20 (trombectomía) (Bleday R, Breen E. Clinical Features of hemorrhoids Sabiston Textbook of surgery 16 edition, 2001: 980-986). Esta intervención en fase aguda ocasiona numerosos malestares e inconvenientes con afectación de la calidad de vida del paciente y riesgos de complicaciones post intervención (Goldman: Cecil Textbook of medicine 21st Ed., Chapter 143 – Diseases of the
25 rectum and anus 570-572).

El tratamiento no quirúrgico de la enfermedad hemorroidal aguda sería muy ventajoso ya que evitaría los inconvenientes explicados anteriormente, incluso en los casos dónde fuera necesaria la hemorroidectomía, ya que este tipo de tratamiento permitiría que el paciente llegara a la operación con mayor calidad
30 de vida y menos complicaciones.

Los agentes trombolíticos tienen la capacidad de lisar el trombo y restaurar el flujo venoso a nivel del canal anal, lo cual sería posible con agentes tales como

el activador tisular del plasminógeno (t-PA), la uroquinasa (u-PA) y la estreptoquinasa (SK), debido a su efecto trombolítico y antiinflamatorio. El mecanismo de acción de cada uno de estos agentes es diferente, como por ejemplo en el caso del t-PA se forma un complejo ternario con la fibrina presente en el coágulo y el plasminógeno, lo que provoca la activación del plasminógeno transformándolo en plasmina, enzima responsable de la lisis de los coágulos sanguíneos. (Zamarron C, Lijnen HR, Collen D. Kinetics of the activation of plasminogen by natural and recombinant tissue-type plasminogen activator, J Biol Chem, 1984; 259: 2080-2083), en el caso de la u-PA es una enzima proteolítica que actúa directamente sobre el plasminógeno la cual degrada a la fibrina lográndose así el efecto trombolítico (Schneider P, Bachmann F, Sauser D. Urokinase: a short review of its properties and of its metabolism. In: D'Angelo A, de. Urokinase: basic and clinical aspects. London: Academic Press, 1982; 1-15). En general el t-PA y la u-PA se han utilizados como fibrinolíticos en enfermedades de origen trombotico como el embolismo pulmonar, la trombosis venosa profunda, entre otras administrados por vía parenteral. (Ouriel K, Veith FJ. Acute lower limb ischemia: determinants of outcome, Surgery 1998; 124:336-342 109); (Manteiga R, Souto C, Altés A, et al. Short-course thrombolysis as the first line of therapy for cardiac valve thrombosis, J Thorac Cardiovasc Surg 1998; 115:780-784). El efecto farmacológico de la estreptoquinasa recombinante (SKr), al igual que la SK natural, es la activación de la fibrinólisis por su vía exógena, donde el paso final en la cascada fibrinolítica es la conversión de plasminógeno a plasmina aumentando el producto de degradación del fibrinógeno (Chesebro J H, Knatterud G, Roberts R, et al. Thrombolysis in myocardial infarction (TIMI) Trial, Phase I. A comparison between intravenous tissue plasminogen activator and intravenous Streptokinase. Clinical Findings through hospital discharge. Circulation 1987; 76: 142-154).

El efecto antiinflamatorio se debe a que cuando se transforma enzimáticamente el plasminógeno en plasmina esta digiere el fibrinógeno, la fibrina o ambos, presentes en las zonas inflamadas o en los coágulos favoreciendo su drenaje y a la vez disminuye el edema y la inflamación (Rosenstein E. Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Cuadragésima primera edición 1995, 778,1539,1730,1798,1437,1436). Por lo que una combinación en una

formulación de más de un agente trombolítico o las combinaciones de estos con agentes antiinflamatorios pudiera obtenerse una eficacia mayor en enfermedades de origen trombótico como la enfermedad hemorroidal aguda.

La estreptoquinasa es una proteína de alto peso molecular que se emplea actualmente para el tratamiento del infarto agudo del miocardio, trombosis venosa profunda, trombosis de acceso vascular permanente y otras enfermedades de origen trombótico. En este sentido se presenta en diferentes formas farmacéuticas tales como pastillas liofilizadas para el uso parenteral. También se ha administrado por vía mucosal, por ejemplo, la VARIDASA, indicada para el alivio del edema de los procesos inflamatorios o administrada oralmente en forma de tabletas. Además, se ha reportado su administración por vía rectal con el objetivo de que la misma actúe a nivel sistémico para el tratamiento de la reabsorción de hematomas o simplemente para comparar su concentración en plasma al ser administradas por la vía rectal y la oral (Olive

15 A, Gidron E. Orally and rectally administered Streptokinase. Investigation of its absorption and activity, Pharmacology 1981; 22(2): 135-138); (de Boer AG, Moolenaar F, de Leede LG, Breimer DD. Rectal drug administration: Clinical pharmacokinetic considerations, Clin Pharmacokinet 1982; 7(4): 285-311).

El uso de las formulaciones rectales descrita en esta invención, las cuales contienen agentes trombolíticos para el tratamiento de la enfermedad hemorroidal aguda, es muy conveniente en la medida en que se trata la patología de forma local, de manera no invasiva, no dolorosa y sin complicaciones para el paciente, debido a su capacidad de eliminar el trombo y la inflamación en la zona afectada.

25 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCION:

El objeto de esta invención es la obtención de formulaciones farmacéuticas y la aplicación de estas en forma de supositorios, las cuales contienen agentes trombolíticos como principio activo, en una base adecuada para el tratamiento de la enfermedad hemorroidal de origen trombótico, teniendo en cuenta su acción trombolítica y antiinflamatoria.

30

En esta invención se describe la obtención de una forma farmacéutica sólida elaborada para ser insertada en la mucosa rectal destinada a ejercer una acción local. Los supositorios de la presente invención se preparan mezclando una base oleaginosa, con los aditivos como preservos, inhibidores de proteasas y la presencia o ausencia de promotores de la absorción, manteniendo una agitación constante, para que la mezcla se enfríe gradualmente hasta una temperatura de entre 30 y 40 °C, que permita la incorporación del agente trombolítico, dispersándolo uniformemente mediante agitación. La mezcla resultante se vierte en los moldes fríos de supositorios donde el llenado se realiza en exceso, se deja enfriar hasta solidificación y se raspa el exceso antes de la eyección de los supositorios, almacenándolos a una temperatura entre 2 y 8 °C.

Las formulaciones en forma de supositorios descritas en esta invención tienen como ventaja una acción trombolítica y antiinflamatoria solo con efecto local, sin provocar ninguno de estos efectos a nivel sistémico.

Los agentes trombolíticos empleados pueden ser la SKr (Estrada M P, Hernandez I, et al. High level expression of streptokinase in Escherichia coli. Biotechnology 1992; 10: 1138-1142). en una concentración entre 50000 y 1500000 UI/g y el t-PA (Harris TJR. Second - generation plasminogen activators, Protein Engineering 1987; 1(6): 449-458), en una concentración entre 500000 y 50000000 UI/g, entre otros.

En esta invención se emplean aditivos tales como inhibidores de proteasas y promotores de la absorción (Aryn P, Sayani and Yie, Chien.W. Systemic Delivery of Peptides and Proteins Across Absorptive Mucosae. Critical ReviewsTM in Therapeutic Drug Carrier Systems 1996;13(1 & 2): 85-184); (Lee W A, Ennis R D, Longenecker J P, and Bengtsson P. The bioavailability of intranasal calcitonin in healthy volunteers with and without a permeation enhancer. Pharm. Res 1994; 11: 747); (Loughuth P, Meric H P, Amidon O L. Oral absorption of peptides: The effect of absorption site and enzyme inhibition on the systemic availability of metkephamide. Pharm Res 1994; 11:528-535); (Nakanishi K, Masukawa T, Masada M, Nadai T. Improvement of the rectal bioavailability of latamoxef sodium by adjuvants following administration of a

suppository. Biol Pharm Bull 1994; 17(11): 1496-500). En particular se emplearon promotores tales como agentes quelantes (0.05%-10%), agentes surfactantes(0.03%-8%), sales de sodio (0.01%-10%), y el diclofenaco sódico(0.1-10%), con resultados satisfactorios.

- 5 Además se seleccionaron inhibidores de proteasas sobre la base de la capacidad que tenga de inhibir las enzimas responsables de la degradación del péptido en la zona de administración. Algunos inhibidores protegen péptidos específicos, otros estabilizan una amplia gama de éstos. Sin embargo es necesario tener en cuenta que el inhibidor no afecte la integridad de la
- 10 membrana, siendo éste uno de los problemas que tienen este tipo de sustancias (NishihataT, Howard J. Absorption-promoting adjuvants: enhancing action on rectal absorption. Advanced Drug Delivery Reviews 1997; 28: 205-228). En esta invencion se emplearon los agentes quelantes en concentraciones entre 0.02%-5% con buenos resultados (Sayani A P, Kim D
- 15 D, Frenkl T L, Chun I K, Wang Y J, and Chien Y W. Transmucosal delivery of enkephalins: Comparative enhancing effects of dehydrofusidates and bile salts, Sci. Tech. Pharm. Sci. (STP Pharma) 1994; 4: 470); (Chun I K and Chien Y w. Stabilization of meghionine enkephalins in various rabbit mucosal extracts by enzyme inhibitors, Inst.J.Pharm, 1995; 121: 217); (Yamamoto.A, Muranishi S.
- 20 Rectal drug delivery systems. Improvement of rectal peptide absorption by absorption enhancers, protease inhibitors and chemical modification. Advanced Drug Delivery Reviews 1997; 28: 275-299).

Además, se emplean bases sintéticas obtenidos por vía química como la Novata y el Witepsol. Este tipo de bases presentan bajo punto de fusión por lo

- 25 que funden en el recto liberando el fármaco para su posterior efecto terapéutico. (Faulí I Trillo C. Tratado de Farmacia Galénica 2000, Editorial Luzón 5, S.A de Ediciones Madrid; 77 – 103, 739 – 774).

En la fase acuosa de la formulación se emplean agentes preservantes como el metil y propil parabenos (0.01-5%).

- 30 Los supositorios descritos en esta invención son capaces de ejercen su acción trombolítica y antiinflamatoria local en la mucosa rectal.

DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS:

Figura 1. Resultados del índice de irritación rectal por grupo

Figura 2. Desarrollo experimental de enfermedad hemorroidal aguda en conejo:
0, 10 y 24 h

5 Figura 3. Biomodelo de enfermedad hemorroidal aguda en conejo. Histología

Figura 4. Eficacia trombolítica de diferentes formulaciones en conejos con
enfermedad hemorroidal aguda.

Figura 5. Trombo antes y después de aplicar la formulación. Histología

Figura 6. Paciente tratado con supositorio que contiene tPA.

10 Figura 7. Paciente tratado con supositorio contiene SKr.

EJEMPLOS DE REALIZACIÓN

EJEMPLO 1: *Formulación de supositorios que contiene SKr y tPA como principio*
15 *activo.*

Formulación A: Se funde la Novata o la Wetepsol en baño de María a 55°C. Se le añade metil y propil parabeno (0.01 - 0.5%), de forma continua, con agitación constante hasta lograr una dispersión homogénea y se deja enfriar hasta una temperatura entre 36 – 40 °C, posteriormente se le incorpora la SKr
20 (50 000 – 1.500.000 UI/g) con agitación constante. La mezcla se vierte en moldes fríos de supositorio de 2-3 g. Se deja solidificar y se raspa el exceso hasta posterior eyección.

Formulación A1: Se funde la Novata o la Wetepsol en baño de María a 55°C. Se le añade metil y propil parabeno (0.01 - 0.5%), de forma continua, con agitación constante hasta lograr una dispersión homogénea y se deja enfriar hasta una temperatura entre 36 – 40 °C, posteriormente se le incorpora el t-PA
25 (500000-50000000 UI/g) con agitación constante. La mezcla se vierte en moldes fríos de supositorio de 2-3 g. Se deja solidificar y se raspa el exceso hasta posterior eyección.

30 **Formulación B:** Se elabora según procedimiento descrito en A, pero se le añade además EDTA (0.05 - 10%).

Formulación B1: Se elabora según procedimiento descrito en **A1**, pero se le añade además EDTA (0.05 - 10%).

Formulación C: Se elabora según procedimiento descrito en **B** pero se le añade además diclofenaco de sodio (0.1 - 10%).

- 5 **Formulación C1:** Se elabora según procedimiento descrito en **B1**, pero se le añade además diclofenaco de sodio (0.1 - 10%).

Formulación D: Se elabora según procedimiento descrito en **B**, pero se le añade además salicilato de sodio (0.01 - 10%).

- 10 **Formulación D1:** Se elabora según procedimiento descrito en **B1**, pero se le añade además salicilato de sodio (0.01 - 10%).

Formulación E: Se elabora según procedimiento descrito en **B**, pero se le adiciona además tween 20 (0.03%-8%).

Formulación E1: Se elabora según procedimiento descrito en **B**, pero se le adiciona además tween 20 (0.03%-8%).

15 **EJEMPLO 2: *Evaluación de la irritabilidad rectal de las formulaciones.***

El procedimiento para determinar irritabilidad rectal se realiza según método descrito (PNT/TEC/0210/ Irritabilidad rectal/ G.García; 1995)

- 20 Se emplean en el estudio Conejos albinos F1, NZ & SGB, hembras, de una misma línea, sanos, con peso promedio de 2.35 kg. Los animales se distribuyen aleatoriamente en seis grupos de tres cada uno. Los conejos permanecen en cuarentena durante 5 días y su alimentación y consumo de agua es ad Libitum. Las formulaciones en cada caso se aplican cada 24 h, durante 5 días consecutivos.

Los animales se distribuyen de la siguiente forma:

GRUPO I	No tratados, grupo control
GRUPO del II -VI	Tratados con las formulaciones A, B, C, D, E respectivamente del ejemplo 1.

Posteriormente se realiza la evaluación histopatológica, macroscópica y microscópica de la mucosa rectal de los conejos y se calcula el índice de irritabilidad rectal.

5 Durante y después de terminado el ensayo, no se observó evidencia alguna de alteraciones macroscópicas en la mucosa rectal, además no se mostró síntomas ni signos que los sugieran, como edema, eritema y secreciones.

Posteriormente se realizó la evaluación microscópica de la reacción del tejido rectal para cada una de las formulaciones. Se analizaron parámetros como infiltración leucocitaria, congestión vascular y edema, calculando los índices de
10 irritación rectal.

Los resultados se muestran en la figura 1.

Este estudio demostró que los supositorios elaborados no resultaron irritantes de la mucosa rectal pues, como se muestra en la figura No.1 el índice de irritabilidad se encuentre en el intervalo de 0 a 0.4 en todos los casos, valor que
15 está por debajo del índice de irritabilidad mínima.

Al evaluar las formulaciones que contenían tPA como principio activo se obtuvo un resultado similar.

EJEMPLO 3: *Biomodelo de trombosis Hemorroidal.*

El Biomodelo fue preparado por medio de la aplicación de aceite de crotton en la porción ano-recto de conejos F1 (N2 & SGB), hembras con un peso
20 promedio de 2 a 2,5 Kg. El algodón embebido con la solución inductora (la cual consistió en agua, piridina, dietil éter y aceite de crotton al 6 %) fue insertado en el ano.

Las siguientes condiciones fueron las óptimas para realizar el modelo: el aplicador embebido en 800 ul de solución inductora fue aplicado en el ano de
25 conejos hembras de 12 - 15 semanas de edad por 60 seg. El edema fue desarrollado linealmente hasta 10 h después de la aplicación y la severidad del edema fue sostenida casi constantemente hasta las 30 h. Las observaciones macroscópicas desde 4 h hasta las 30 h post administración revelaron
30 homogénea y consistente inflamación en la porción ano-recto aplicada. Observaciones histológicas mostraron apariencia de edema, infiltración de

fibrina, vasodilatación, células inflamatorias congestión de sangre y necrosis de la mucosa. Este modelo fue útil para la evaluación del efecto trombolítico de los productos ensayados así como la actividad anti-inflamatoria de las diferentes formulaciones.

- 5 Tabla 1 Observaciones clínicas del ano después de 60 segundos de exposición con la solución inductora. Ver figuras 2 y 3.

T. DE OBSERVACIÓN (H)	EXPOSICIÓN 60"
4	Edema bien definido, enrojecimiento
10	Congestión, edema, formación de vesículas
24	Vesículas bien definidas, eritemas enrojecidos
30	Inflamación severa, secreción mucopurulenta, vesículas, presencia de algunas úlceras.
48	inflamación moderada, algunas vesículas y úlceras necrosadas.

EJEMPLO 4: Evaluación del efecto trombolítico y antiinflamatorio de las formulaciones A, A'; B, B'; C, C; D, D'; E, E'.

- 10 Este ensayo se realizó según procedimiento descrito en el ejemplo 3; los conejos fueron distribuidos aleatoriamente en 5 grupos de 8 animales cada uno. Previo a la aplicación de los supositorios siempre se seleccionó un grupo control de 3 animales para demostrar la presencia de trombo por examen histológico. Una vez administrada las diferentes formulaciones se tomaron
- 15 muestras de sangre (suero/plasma) desde 0 hasta 24 h, para medir diferentes marcadores de reacción inflamatoria, y parámetros hemostáticos como: Proteína C Reactiva, infiltración neutrófilos, Producto Degradación de la Fibrina (PDF), niveles de fibrinógeno y tiempo de protombina. Además se realizaron las observaciones clínicas, y la evaluación histológica de la mucosa rectal.
- 20 Según los resultados que se muestran en la figura 4, podemos plantear que todas las formulaciones fueron capaces de realizar la lisis del trombo, con mejores resultados para aquellas formulaciones que contenían salicilato de

sodio y EDTA (D, D1); obteniendo resultados mayores de un 66% tanto para la formulación de SK como para la que contiene tPA..

Como era de esperar el placebo no actuó sobre el trombo, ni se observó evidencia alguna de alteraciones macroscópicas a nivel de la mucosa. Se
5 utilizó otro grupo control de 4 conejos a los que se le provocó la trombosis hemorroidal pero no se le administró ninguna formulación, con el objetivo de conocer si existía alguna reacción cruzada con el mecanismo fisiológico de eliminación del trombo; se comprobó que el efecto encontrado fue propio de cada formulación.

10 **EJEMPLO 5: Estudio clínico realizado a pacientes con enfermedad hemorroidal aguda trombosada.**

La sintomatología de los pacientes portadores de una hemorroides trombosadas son molestas y muy dolorosas. Si es el primer episodio, el
15 tratamiento médico puede solucionar el problema en corto tiempo. Cuando los episodios se repiten es necesario realizar un tratamiento quirúrgico mínimo (trombectomía) con la consecuente afectación de la calidad de vida del paciente.

Un ensayo clínico fase II fue desarrollado con el objetivo de evaluar el efecto de una nueva formulación de un supositorio como método para tratar la
20 enfermedad hemorroidal en fase aguda.

En el estudio clínico se incluyeron 24 pacientes (divididos en 3 grupos de 8 cada uno) con diagnóstico de enfermedad hemorroidal aguda trombosada que permanecieron ingresados 4 días como estadía promedio.

Grupo I	Tratados con un supositorio de SKr + tratamiento habitual.
Grupo II	Tratados con un supositorio de tPA + tratamiento habitual.
Grupo III	Grupo control utilizando tratamiento habitual que consiste en:
	Reposo en posición de Trendelenburg,
	Abundantes líquidos
	Baños de asientos tibios
	Uso del cojín de kelly
	Alivio del dolor
	Uso de laxantes orales

25 Los criterios de inclusión y exclusión fueron los siguientes:

Inclusión

Edades entre 18 y 50 años

Consentimiento informado firmado por escrito

Dolor de más de 48 horas de comienzo de los síntomas

- 5 Protusión del paquete hemorroidal mantenido por mas de 48 horas

Exclusión

Pacientes que refieran contraindicación al uso de los trombolíticos.

- En los cuadernos de recogida de datos de los pacientes se recogieron los datos personales las características demográficas y de base de la enfermedad y la evaluación de la eficacia y los eventos adversos de los tratamientos en estudio. Los resultados se compararon usando test de chi cuadrado y test de Fischer. Se crearon tablas con los resultados encontrados.
- 10

Tabla 2. Parámetros evaluados para cada tratamiento

PARÁMETROS EVALUADOS	SUPOSITORIO DE SKr (N=8)		SUPOSITORIO DE t-PA (N=8)		TRATAMIENTO HABITUAL (N=8)	
	N	%	N	%	N	%
Clínicos						
Desaparición del dolor	7/8	87.5	6/8	75	4/8	50
Desaparición del edema	7/8	87.5	5/8	62.5	6/8	75
Desaparición del prurito	7/8	87.5	7/8	87.5	5/8	62.5
Regresión del trombo *	6/8	75	4/8	50	3/8	37.5
Necesidad de Cirugía						
trombectomía	2	25	4	50	5	62.5
Duración del tratamiento (días) *	4		6		10	
Suspensión del tratamiento en estudio	1	12.5	3	37.5	-	-

15 *p > 0.001

- Al analizar los parámetros evaluados observamos que desde el punto de vista clínico el dolor, edema y regresión del trombo adquieren un valor importante y de hecho el porcentaje de mayor de curación es alcanzado en la formulación de SKr aunque no sea estadísticamente significativa por el escaso número de pacientes evaluados. En cuanto a la necesidad de tratamiento quirúrgico mínimo parámetro que mide variable principal de respuesta si observamos significación estadística (tabla I). De igual forma se comportó la duración del
- 20

tratamiento que favoreció a la formulación de SKr y de tPA, aunque fue en menos tiempo la de SKr.

Tabla 3. Respuesta al tratamiento seleccionado

RESPUESTA AL TRATAMIENTO	SUPOSITORIO DE SKR		SUPOSITORIO DE TPA		TRATAMIENTO HABITUAL	
Total	6	(75%)	4	(50%)	3	(37.5%)
Parcial	1	(12.5%)	2	(25%)	1	(12.5%)
No respuesta	1	(12.5%)	2	(25%)	4	(50%)

5

De los 24 pacientes tratados 13 tuvieron respuesta total al tratamiento utilizado (54.1%). La eficacia en la respuesta favoreció significativamente a la formulación con SKr (75%) (Tabla III) comparada con los pacientes tratados con tPA y el tratamiento habitual (Figura 6 y 7).

- 10 Los resultados de este estudio demuestran que el uso del supositorio por vía rectal para la enfermedad hemorroidal aguda trombosada mejora significativamente la "curación" y resolución del cuadro inflamatorio.

VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

- 15 Con las formulaciones de la presente invención se logra la eliminación del trombo con la consiguiente disminución de la inflamación y el dolor en la zona afectada, sin efectos trombolíticos sistémicos. Además, permite solucionar la patología localmente, de manera no invasiva y no dolorosa, no requiere de personal ni equipamiento especializado para su aplicación, y se hace posible el
- 20 tratamiento de la enfermedad hemorroidal aguda de forma no quirúrgica, por lo que evita los inconvenientes propios de estos tratamientos.

25

Lic. Argia Roveda Marcheco
Representante Legal, CIGB



30

REIVINDICACIONES**FORMULACIONES QUE CONTIENEN AGENTES DE ACCIÓN
TROMBOLÍTICA PARA SU ADMINISTRACION POR VÍA RECTAL**


- 5 1. Una formulación en forma de supositorio para la administración rectal caracterizada porque contiene:
 - Péptidos y proteínas con acción trombolítica farmacológicamente activos.
 - Una base oleaginoso.
 - Aditivos tales como: promotores de la absorción, inhibidores de proteasas y
- 10 2. Una formulación según reivindicación 1 caracterizada por contener una o varias proteínas con acción trombolítica y/o antiinflamatorias, tales como estreptoquinasa, uroquinasa y/o activador tisular del plasminógeno.
- 15 3. Una formulación según reivindicación 1 caracterizada por contener estreptoquinasa recombinante a una concentración de 50 000 – 1.500.000 UI/g.
4. Una formulación según reivindicación 1 caracterizada por contener estreptoquinasa natural a una concentración de 50 000 – 1.500.000 UI/g.
- 20 5. Una formulación según reivindicación 1 caracterizada por contener uroquinasa a una concentración de 50 000 - 1.000.000 UI/g
6. Una formulación según reivindicación 1 caracterizada por contener activador tisular del plasminógeno a una concentración de 500000-50000000 UI/g.
- 25 7. Una formulación según reivindicaciones 1 - 6, caracterizada porque contiene promotores de la absorción mucosal tales como, diclofenaco de sodio, y/o salicilato de sodio.
8. Una formulación según reivindicaciones 1 - 6 caracterizada porque contiene un inhibidor de proteasas.

9. Una formulación según reivindicación 8 caracterizada porque el inhibidor de proteasas es el EDTA.
10. Una formulación según reivindicaciones 1 – 7, 8 y 9, caracterizada porque la base oleaginosa es el Witepsol H15.
- 5 11. Una formulación según reivindicaciones 1 – 10, caracterizada porque el peso promedio del supositorio es de 1 – 3 g.
12. Una formulación según reivindicaciones 1 – 11 caracterizada porque ser eficaz, sin efectos sistémicos, en el tratamiento de la enfermedad hemorroidal.
- 10 13. Un método para el tratamiento de la hemorroide caracterizado por el uso de péptidos y proteínas con acción trombolítica vía rectal en forma de supositorio.
14. Un método de acuerdo a la reivindicación 13 caracterizado porque la proteína con acción trombolítica es la estreptoquinasa o péptidos derivados de ella.
- 15 15. Un método de acuerdo a la reivindicación 13 caracterizado porque la proteína con acción trombolítica es la uroquinasa o péptidos derivados de ella.
16. Un método de acuerdo a la reivindicación 13 caracterizado porque la proteína con acción trombolítica es el activador tisular del plasminógeno o péptidos derivados de él.
- 20 17. El uso de péptidos y proteínas con acción trombolítica para el tratamiento de la hemorroide caracterizado por su empleo por vía rectal y en forma de supositorio.
- 25 18. El uso de acuerdo a la reivindicación 17 donde la proteína con acción trombolítica es la estreptoquinasa o péptidos derivados de ella para el tratamiento de la hemorroide caracterizado por su empleo por vía rectal y en forma de supositorio.

19. El uso de acuerdo a la reivindicación 17 donde la proteína con acción trombolítica es la uroquinasa o péptidos derivados de ella para el tratamiento de la hemorroide caracterizado por su empleo por vía rectal y en forma de supositorio.

5 20. El uso de acuerdo a la reivindicación 17 donde la proteína con acción trombolítica es el activador tisular del plasminógeno o péptidos derivados de él para el tratamiento de la hemorroide caracterizado por su empleo por vía rectal y en forma de supositorio.


10


Lic. Argia Poveda Marcheco,
Representante Legal 075
CIGB



15


Figura. 1



5



Figura. 2



5



Figura. 3




Figura. 4






Figura. 5



5 Figura.6



Handwritten signature.



Figura.7



Paquete hemorroidal
externo trombosado



Respuesta al 4to día de tratamiento
con supositorio de SKr

[Handwritten signature]

